

林邊國中 防疫物資管理辦法

林邊國中防疫應變小組 110.04.29

一、依據：

- (一) 中華民國 110 年 4 月 23 日屏府教前字第 11014951700 號(如附件一)
- (二) 行政院「物品管理手冊」法規
- (三) 衛福部疾管署防疫物資及資源建置實施辦法
- (四) 教育部學校衛生法

二、防疫物資管理及使用權限：

實施對象：林邊國中全校教職員工及學生

林邊國中 109 學年度衛生組及健康中心共同管理的防疫物資使用說明		
保管地點	項目	領用說明
健康中心	(一) 香皂(袋)	1、班級負責學生適時向健康中心或衛生組適量領取並置入香皂袋。 2、禁止囤積。
	(二) 口罩	1、個人使用，請自備。 2、若有緊急狀況，學生應向護理師、衛生組或學務處人員申領登記，不得擅自取用。
	(三) 額溫槍	☆ 有緊急狀況時，向護理師或衛生組登記領用，並適時歸還。
	(四) 酒精	1、向護理師或衛生組登記領用，並妥善保管。 2、班級學生不當使用，依校規懲處並賠償。
	(五) 次氯酸噴霧機	☆ 若班級/專科教室或辦公室有必要實施大範圍消毒時，由志工代表陳先生或安心就業鄭先生向護理師或衛生組登記進行協助性消毒。
	(六) 次氯酸水	(同第五項目)

衛生組	(七) 漂白水	(請參考期初校務會議學務處工作報告☆6) 依據疾管局「居家環境消毒建議」調配比例(附件二)
	(八) 抹布	㊟消毒擦拭課桌椅等。
	(九) 水桶	㊟盛裝擦拭用消毒劑。

☆6、學期中，班級如有學生發燒或嘔吐，務必指派衛生股長至衛生組領取消毒用品

① 桌椅消毒：由衛生組提供水桶、消毒水、塑膠手套、抹布。

② 地板消毒：衛生股長攜帶班級水桶至衛生組盛裝消毒水並領取塑膠手套。

三、本實施辦法未規定事項，得適時補充修正之。

◇ 防疫物資依疫情變化及本校物資撥配隨時調整，請珍惜資源，勿囤積、勿浪費。

◇ 凡請導師張貼並加強宣導。

(附件一)

檔 號：
保存年限：

屏東縣政府 函

地址：900219屏東縣屏東市自由路527號
承辦人：劉全貴
電話：08-7320415#3674
傳真：08-7323291
電子信箱：a002303@oa.pthg.gov.tw

受文者：屏東縣立林邊國民中學

發文日期：中華民國110年4月23日
發文字號：屏府教前字第11014951700號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：說明二 (3535066_11014951700_1_3535066_11014951700_1.odt)

主旨：邇來校園發生學生水壺遭摻入漂白水事件，請學校加強落實防疫物資管理，避免學生濫用或誤用，以維護校園安全，請查照。

說明：

- 一、依本府109年5月22日屏府教前字第10918887200號函說明二，為有效掌握並依行政院頒「物品管理手冊」執行，謹慎處理防疫物資發放、管理及使用等事宜，請各校（園）務必依「防疫物資盤點及檢核表」落實辦理相關作業。
- 二、檢附「防疫物資盤點及檢核表」。

正本：各高國中、本縣各國小(不含大路關、崇華)、高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學、高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校、本縣各鄉鎮立幼兒園、私立教保服務機構

副本：本府教育處學前教育科



本案依分層負責規定授權業務主管決行

(附件二)

居家環境消毒建議

- 1.當流感大流行時，其病毒會存在於環境中，因此，清潔與消毒是有效減少感染源的方式之一，而且消毒之前必須先進行清潔，除餐具可煮沸消毒，其他處所可使用 70%酒精（乙醇）或含氯消毒劑（如漂白水、漂白粉）進行消毒。詳細請參考附件。
- 2.為便於維持環境整潔，可暫時移除接待室裡所有的雜誌或玩具。另流感病毒可能於空氣不流通的室內散播，故室內應該保持空氣流通。使用冷氣空調系統的辦公大樓，應根據適當的標準加以妥善維護與防護。

消毒劑的使用 (摘自 2006 年 WHO 感染控制指引)

酒精濃度 70%的酒精是強效且廣效的殺菌劑，常用來消毒小範圍的表面和一些儀器的表面。因為酒精為易燃物，若當表面消毒劑使用時，須限制在小範圍表面積的消毒，且只能使用在通風良好處以避免燃燒。而酒精在長期和重複使用後也可能對橡膠或部分塑膠造成退色、膨脹、硬化和破裂。市售藥用酒精未稀釋之濃度為 95%，可以蒸餾水或煮沸過冷水依需要消毒之使用量稀釋為 70-75%濃度之酒精。簡易之方法為 3 份 95%酒精加 1 份水，稀釋後濃度為 71.25%。

含氯消毒劑 (漂白水、漂白粉)

選擇成分為「次氯酸鈉(sodium hypochlorite)」之市售漂白水稀釋後使用，一般漂白水多未標示濃度，但大部分濃度為 5-6%。稀釋的家用漂白水在不同接觸時間(10 分鐘~ 60 分鐘)皆有作用，且價格便宜，一般建議醫療機構作為消毒劑。然而漂白水會刺激黏膜、皮膚和呼吸道，且會在光或熱下分解，並容易與其他化學物質起反應，因此使用漂白水必須小心。不當的使用會降低其消毒效果並造成人員傷害。

配製或使用稀釋漂白水的方法：

- 使用口罩、橡膠手套和防水圍裙，最好也使用護目鏡保護眼鏡以避免被噴濺到。
- 在通風良好處配製和使用漂白水。
- 使用冷水稀釋，因為熱水會分解次氯酸鈉並降低其消毒效果。
- 一般漂白劑含有 5% 次氯酸鈉應按照以下表格稀釋。

次氯酸鈉(sodium hypochlorite)濃度和使用：

初始溶液	大部分家用漂白水含有 5%次氯酸鈉(50000 ppm 有效氯)。
建議稀釋比例	若是含 5%次氯酸鈉，建議以 1：100 稀釋。也就是 1 份漂白水加 99 份的冷水作為表面消毒。 若需要不同濃度的漂白水也可依此稀釋比率調整。如含 2.5%次氯酸鈉，則是 2 份漂白水再加 98 份的冷水。
稀釋後有效氯含量	含 5%次氯酸鈉的漂白水以 1：100 稀釋後則是 0.05%或 500 ppm 有效氯。不同濃度的漂白水以同比例稀釋後則會得到不同含量的有效氯。
不同消毒方式的接觸時間 ▪擦拭消毒不具孔隙的表面	▪擦拭消毒的接觸時間建議超過 10 分鐘
▪浸泡消毒方式 在消毒擦拭之前應將表面的有機物清除乾淨，例如：分泌液、黏液、嘔吐物、排泄物、血液和其他體液，使漂白水可以充分作用。	▪浸泡消毒的接觸時間建議超過 30 分鐘

*ppm：百萬分之一

使用漂白水注意事項

- 漂白水會腐蝕金屬及破壞油漆表面。
- 避免接觸眼睛。如果漂白水濺入眼睛，須以清水沖洗至少 15 分鐘及看醫生。
- 不要與其他家用清潔劑一併或混和使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。
- 當漂白水和其他酸性清潔劑(如一些潔廁劑)混合時，會產生有毒氣體，可能造成傷害或死亡。如有需要，應先使用清潔劑並用水充分清洗後，才用漂白水消毒。
- 未稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，所以應放置於陰涼及兒童碰不到的地方。
- 由於次氯酸鈉會隨時間漸漸分解，因此宜選購生產日期較近的漂白水，並且不要過量儲存，以免影響殺菌功能。
- 若要使用稀釋的漂白水，應當天配製並標示日期名稱，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。
- 有機物質會降低漂白水效果，在消毒之前該先將待消物品表面的有機物清除乾淨。
- 稀釋的漂白水必須加蓋以避免陽光照射，最好存放在避光的容器並避免兒童碰觸。